

Памятка для родителей

Иммунизация против полиомиелита

До тех пор, пока в мире не останется ни одного ребенка, инфицированного полиомиелитом, риску заражения этой болезнью будут подвергаться дети во всех странах. Полиовирус легко импортируется в страну, свободную от полиомиелита, и может быстро распространиться среди неиммунизированных групп населения. Полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить с помощью вакцинации. Прививки против полиомиелита входят в календарь профилактических прививок Российской Федерации.

Вакцинация состоит из трех прививок и проводится детям в возрасте 3, 4,5 и 6 месяцев с использованием инактивированной вакцины против полиомиелита (ИПВ).

Первая ревакцинация проводится детям в возрасте 18 месяцев инактивированной полиомиелитной вакциной.

Вторая ревакцинация (20 месяцев) и третья ревакцинация (6 лет) проводится оральной полиовакциной.

Дети и взрослые, выезжающие или въезжающие в страны, где регистрируются случаи полиомиелита, должны быть привиты против этой инфекции. Кроме того, с целью профилактики полиомиелита необходимо:

- соблюдать правила личной гигиены (мытьё рук);
- свежие овощи, фрукты, сухофрукты и зелень, перед употреблением, промыть под проточной водой сполоснуть кипяченой или бутилированной водой.

ПОЛИОМИЕЛИТ - это вирусное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее полный паралич.

Вирус попадает в организм через рот и размножается в кишечнике. Первоначальными симптомами являются высокая температура, усталость, головная боль, тошнота, ригидность шеи и боль в конечностях. Один из 200 случаев инфицирования приводит к необратимому параличу (обычно ног). Из таких парализованных 5%-10% умирают в результате иммобилизации дыхательной мускулатуры.

ГРУППА ПОВЫШЕННОГО РИСКА.

Полиомиелит поражает, в основном, детей в возрасте до пяти лет.

Источником инфекции являются больные и вирусоносители. Выделение вируса из глотки и с фекалиями начинается в инкубационный период, который продолжается в среднем 5-12 дней (возможны колебания от 2 до 35 дней). После появления первых симптомов заболевания вирус продолжает

выделяться с фекалиями. Поэтому главное значение имеет фекально-оральный механизм передачи инфекции через загрязненные фекалиями воду и пищевые продукты. В эпидемических очагах может происходить инфицирование людей воздушно-капельным путем.

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

- высокая температура;
- усталость;
- головная боль;
- тошнота;
- боль в конечностях.

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ!

Если у ребенка возникли жалобы на снижение опоры на ноги, нарушение походки (часто спотыкается, «тянет ногу», «шлепает» ею), немедленно проконсультируйте его у невролога.

Своевременное обращение к врачу - залог успешного лечения и быстрого выздоровления.